

■ PATSIENDI ANDMED Nimi: _____ _____ Isikukood Sugu N <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Diagnoos _____	■ TELLIJAJ ANDMED Saatev asutus: _____ _____ Osakond _____ Arst _____ Tel _____
--	---

Uriin kogutud “ _____ ” - “ _____ ” . _____ 20 _____ .a. Diurees (kui määratud saatja poolt): _____ ml/24h <i>Proovi võtmisel kehtivad lepingus kokkulepitud tingimused</i>
--

KATEHHOOLAMIINIDE SAATELEHT

METANEFRIINI JA NORMETANEFRIINI uuring 24-h uriinist

Kogumisjuhised

- Ööpäevane ehk 24 tunni uriin kogutakse puhtasse kaanega suletavasse mõõteskaalaga kogumisnõusse (mahtuvus 2 – 3 liitrit).
- Patsient ei vaja analüüsiks erilist ettevalmistust.
- Uriini kogumise esimese päeva hommikul tühjendada põis WC potti, fikseerida urineerimise kellaeg saatekirjale (uriini kogumise alguse aeg).
- Peale esimest uriiniportsjonit lisatakse kogumisnõusse konservandina kontsentreeritud soolhapet (HCl – tugeva söövitava toimega!) - 10 mL
- Soolhape antakse laborist kaasa koos kogumisnõuga.
- Kõik järgnevad uriiniportsjonid koguda kogumisnõusse, ükski uriiniportsjon ei tohi kaotsi minna.
- Kogumisnõu hoida urineerimiste vahel jahedas ja pimedas.
- Iga järgneva uriiniportsjoni lisandumisel tuleb uriini segada.
- Viimane uriiniportsjon võtta järgmise päeva hommikul samal kellaajal kogumise algusega, fikseerida kogumise lõpp-aeg saatekirjal.
- Mõõta kogumisnõu mõõteskaala abil ööpäevase uriini kogus ja märkida see saatekirjale.
- Laborisse võib saata kogumisnõu kogu uriiniga või sellest umbes 50 mL (enne segada kogutud uriin hoolikalt).
- Proovinõu markeerida.