


STLI haavandi diagnostiline paneel

Arsti meelespea



STLI haavandi diagnostiline paneel

Miks?

Viimastel aastatel on infektsioonhaiguste laboratoorne diagnostika liikumas suunas, kus sarnast kliinilist pilti põhjustavate haigustekitajate määramine koondatakse asjakohastesse paneelidesse. Selline lähenemine tagab arstidele eelkõige aja kokkuhoiu, samas suureneb patsiendi kohta saadava info hulk.

Seksuaalsel teel levivate infektsioonide (STLI) ultseratiivsete haiguste diagnostilisse paneeli kuuluvad haigustekitajad põhjustavad **üsna sarnast kliinilist pilti**. Samas on nende **ravi erinev** ning seega on vajalik patogeeni eelnev laboratoorne tuvastamine. Haigustekitajate kompleksne (paneelina) määramine annab täpse vastuse konkreetse tekitaja esinemise kohta, see omakorda **loob eelduse korrektseks raviks**.

Kellele?

STLI haavandi diagnostilisse paneeli on koondatud **kõik kliiniliselt olulisemad sugulisel teel levivad haavandeid tekitavad patogeenid**. Tuvastatakse järgmised haigustekitajad: *Herpes simplex virus 1*, *Herpes simplex virus 2*, *Treponema pallidum*, *Haemophilus ducreyi* ja *Chlamydia trachomatis* LGV. Paneeli koostamisel on SYNLAB Eesti kasutanud mitmete erialaspetsialistide abi.

Kuidas?

STLI haavandi diagnostilise paneeli teostamisel kasutab SYNLAB Eesti tehnilise ülesehituse poolest Eestis ainulaadset ja maailmas järjest enam kasutamist leidvat lähenemist (PCR + Luminex xMap®). Kõik paneeli kuuluvad patogeenid tuvastatakse **korraga ühest proovimaterjalist**.

Analüüs:	STLI haavandi diagnostiline paneel
Näidustus:	Kahtlus sugulisel teel levivale infektsioonile
Uuritav materjal:	Villisisu, haavandi kaabe
Analüüsimeetod:	PCR, hübriidsatsioonanalüüs (Luminex xMAP®)
HK kood:	66608 x 2