

Esmasjoauriini kogumine

Analüüsimaterjali kogumise protseduuri soovitame läbi viia tualetis või vannitoas. Molekulaardiagnostiliseks (PCR) uuringuks tuleks koguda kindlasti **hommikune uriin (esmasjoauriin)**.

Enne urineerimist on soovitav suguelundit kergelt masseerida, see kindlustab uuringuks vajaliku materjali sattumise analüüsi. Analüüsimiseks on vajalik **vähemalt pool topsi uriini** ja uriini kogumise juures peab olema kindel, et tuubi kogutakse **ka esimesed tilgad uriini**.

Peale proovimaterjali kogumist tuleb kindlasti veenduda, et uriinitops on kindlalt kaanega suletud, uriinitopsile palume kirjutada oma nimi.

Palume pakendada uriinitops kilekotti.

Сбор первой порции мочи

Процедуру сбора материала рекомендуем проводить в туалете или ванной комнате. Для исследования методом молекулярной диагностики (ПЦР) следует собрать именно **первую порцию утренней мочи**.

Не следует проводить туалет наружных половых органов перед сбором мочи для исследования. Перед актом мочеиспускания рекомендуется слегка помассировать половые органы, это способствует попаданию в мочу необходимого для исследования материала. Для исследования необходимо **минимум полстакана мочи**. В процессе сбора мочи важно обратить внимание на то, чтобы **первые капли мочи обязательно** были собраны.

После завершения процедуры сбора мочи, убедитесь, что крышка контейнера надежно закрыта.

Пожалуйста, упакуйте стаканчик с мочой в полиэтиленовый пакет.